

CORSO DI ALGEBRA (M-Z)

Prof. A. Venezia

Complementi ed Esercizi

11/12/2012

1. SPAZI VETTORIALI: prime proprietà.

In uno spazio vettoriale $(V, +, \cdot)$ sul campo \mathbf{K} , il vettore nullo è necessariamente unico e per ogni vettore è anche unico il suo opposto. Inoltre si ha:

1. Per ogni vettore v : $0v = \underline{0}$
2. Per ogni scalare k : $k\underline{0} = \underline{0}$
3. Per ogni vettore v e per ogni scalare k : $k(-v) = -kv = (-k)v$
4. $k v = \underline{0} \Leftrightarrow k = 0$ oppure $v = \underline{0}$.

Dim.1.

Risulta: $0v = (0+0)v =$ (distributiva) $0v + 0v$. Poiché ogni vettore ha un opposto, dalla uguaglianza precedente sommando ad entrambi i termini $-0v$ si ricava.

$$\underline{0} = 0v - 0v = (0v + 0v) - 0v = 0v + (0v - 0v) = 0v + \underline{0} = 0v$$

Dim. 3

$$k(-v) + k v = k(v-v) = k\underline{0} = \underline{0} \text{ dunque } k(-v) \text{ è l'opposto di } kv \text{ e cioè } k(-v) = -kv$$
$$(-k)v + kv = (k-k)v = 0v = \underline{0}, \text{ cioè } (-k)v = -kv$$

□

ESERCIZIO 1. Dimostrare che le seguenti strutture algebriche, dove $+$ e \cdot indicano rispettivamente le operazioni naturali di somma e prodotto per uno scalare, sono spazi vettoriali su \mathbf{R} : $(M_{m,n}(\mathbf{R}), +, \cdot)$, $(\mathbf{R}^n, +, \cdot)$, $(\mathbf{R}[x], +, \cdot)$, $(\mathbf{R}^X, +, \cdot)$ con X insieme non vuoto.

CNES affinché un sottoinsieme W non vuoto di uno spazio vettoriale V sia un sottospazio è:

per ogni $a, b \in \mathbf{K}$ e per ogni $w, u \in W$ allora $aw + bu \in W$.

ESERCIZIO 2. Quali dei seguenti sottoinsiemi dello spazio vettoriale $\mathbf{R}^{\mathbf{R}}$ sono sottospazi ?

$$A = \{ f \in \mathbf{R}^{\mathbf{R}} : f(1/2) = 0 \}$$

$$B = \{ f \in \mathbf{R}^{\mathbf{R}} : f(x) \text{ è pari per ogni } x \}$$

$$C = \{ f \in \mathbf{R}^{\mathbf{R}} : f(0) = f(1) \}$$

$$D = \{ f \in \mathbf{R}^{\mathbf{R}} : f(1) = 0 \}$$

$$E = \{ f \in \mathbf{R}^{\mathbf{R}} : f(0) = f(1)^2 \}$$

$$F = \{ f \in \mathbf{R}^{\mathbf{R}} : f(2) - 3f(1) = 0 \}$$

L'intersezione di due sottospazi è sempre un sottospazio, l'unione di due sottospazi W e U è un sottospazio se e solo se $W \subseteq U$ oppure $U \subseteq W$.

Dim.

Supponiamo che $W \cup U$ sia un sottospazio. Si deve quindi dimostrare che se W non è un sottoinsieme di U allora necessariamente U deve essere un sottoinsieme di W . Infatti sia $u \in U$. Poiché W non è contenuto in U , esiste un vettore w di W non appartenente ad U . Si ha $u, w \in W \cup U$ e quindi essendo l'unione un sottospazio il vettore $u + w \in W \cup U$. Il vettore $v = u + w$ non può appartenere ad U (altrimenti $v - u = w \in U$) e quindi appartiene a W , per cui $u = v - w \in W$. Si è dunque dimostrato che ogni vettore u di U appartiene anche a W , cioè $U \subseteq W$.

Ovviamente se $W \subseteq U$, si ha $W \cup U = U$ e quindi l'unione è un sottospazio. □

Il sottospazio $\langle S \rangle$ generato dal sottoinsieme S è l'intersezione di tutti i sottospazi contententi S .

ESERCIZIO 3. Dimostrare che la somma $(U + W)$ di due sottospazi U e W :

$$(U + W) = \{ v \in V : v = u + w \text{ con } u \in U \text{ e } w \in W \}$$

è uguale al sottospazio $\langle (U \cup W) \rangle$ generato da $(U \cup W)$.

La somma $U + W$ si dice diretta, e si indica con $U \oplus W$, se per ogni vettore v di $U + W$ esiste un solo vettore u in U e un solo vettore w in W tale che $v = u + w$. In altre parole la somma si dice diretta se, per ogni vettore v di $U + W$, l'identità :

$$v = u + w = u' + w' \text{ con } u, u' \in U \text{ e } w, w' \in W. \text{ implica } u = u' \text{ e } w = w'.$$

La somma di due sottospazi $U + W$ è diretta se e solo se $U \cap W = \{ \underline{0} \}$

Dim.

Supponiamo che la somma sia diretta. Sia $v \in U \cap W$, se v non fosse il vettore nullo $v = v + 0$ e $v = 0 + v$ sarebbero due modi di scrivere v come somma di un vettore di U e uno di W . Supponiamo viceversa $U \cap W = \{ \underline{0} \}$ e sia $v = u + w = u' + w'$ con $u, u' \in U$ e $w, w' \in W$. Il vettore $u - u' = w' - w \in U \cap W$ e quindi $u - u' = w' - w = \underline{0}$, cioè $u = u'$ e $w = w'$. □

ESEMPIO . Sia $(M_n(\mathbf{R}), +, \cdot)$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate di ordine n .

Data una matrice $A = (a_{ij})$ si dice *trasposta di A* , e si indica con A^t , la matrice le cui righe sono le colonne di A , cioè $A^t = (a_{ji})$. Risulta:

$$(A + B)^t = A^t + B^t \text{ e } (kA)^t = kA^t$$

Una matrice $A = (a_{ij})$ dice *simmetrica* se $A = A^t$ e si dice *antisimmetrica* se $A = -A^t$.

L'insieme U delle matrici simmetriche e l'insieme W delle matrici antisimmetriche sono sottospazi di $M_{nn}(\mathbf{R})$ (dimostrarlo!) e si ha :

$$M_{nn}(\mathbf{R}) = U \oplus W \text{ (dimostrarlo!)}$$

ESERCIZIO 3.

Dati i sottospazi T, U, W di uno spazio vettoriale, dimostrare che, se T è un sottoinsieme di W , allora:

$$T + (U \cap W) = (T + U) \cap W$$

Dim.

Sia v un vettore di $T + (U \cap W)$, allora $v = t + v'$ dove $t \in T$ e $v' \in U \cap W$. Quindi si ha: $v = t + v'$ con $t \in T$ e $v' \in U$, cioè $v \in T + U$. Inoltre v è la somma di due vettori di W ($t \in T \subseteq W$ per ipotesi e $v' \in W$) e quindi v è un vettore di W . Pertanto $v \in (T+U) \cap W$. Analogamente si dimostra che

$$(T+U) \cap W \subseteq T + (U \cap W)$$

□

ESERCIZIO 4. Sia $(V, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale sul campo \mathbf{K} dimostrare che l'insieme dei sottospazi di V con la relazione di inclusione è un reticolo.

ESERCIZIO 5. Per ogni spazio vettoriale elencato nell'esercizio 1, determinare due sottospazi la cui somma è diretta ed è uguale a tutto lo spazio vettoriale.

ESERCIZIO 6. Si consideri il sottoinsieme $S = \{(2,0,0); (0,-3,0)\}$ dello spazio vettoriale \mathbf{R}^3 . Si determini $\langle S \rangle$ e si dimostri che il vettore $(5,-2,0)$ ne è un elemento.

ESERCIZIO 7. Per ciascuno dei sottoinsiemi seguenti si stabilisca se è un sottospazio di $(\mathbf{Z}_7)^4$:

$$W_1 = \{ (a,b,c,d) \in (\mathbf{Z}_7)^4 : a+b+c+d = 0 \}$$

$$W_2 = \{ (a,b,c,d) \in (\mathbf{Z}_7)^4 : a+b+c = 0 \}$$

$$W_3 = \{ (a,b,c,d) \in (\mathbf{Z}_7)^4 : a+b = 0 \}$$

$$W_4 = \{ (a,b,c,d) \in (\mathbf{Z}_7)^4 : a = 0 \}$$

$$W_5 = \{ (a,b,c,d) \in (\mathbf{Z}_7)^4 : a = d \}$$

$$W_6 = \{ (a,b,c,d) \in (\mathbf{Z}_7)^4 : a = d + 1 \}$$

ESERCIZIO 8. Dati i sottoinsiemi :

$$W = \{ (a,b,c,d) \in \mathbf{R}^4 : b = 0 \} \text{ e } U = \{ (a,b,c,d) \in \mathbf{R}^4 : a + d = 0 \}$$

Dimostrare che sono sottospazi di \mathbf{R}^4 e determinare $W \vee U$ e $W \wedge U$.