

Corso di laurea in Informatica
Algoritmi 1
A.A. 2025/26

Notazione Asintotica

Tiziana Calamoneri



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



Slides realizzate sulla base di quelle preparate da T. Calamoneri e G. Bongiovanni per il corso di Informatica Generale tenuto a distanza nell'A.A. 2019/20

Sommario

Ripasso della notazione asintotica:

Notazione O

Notazione Ω

Notazione Θ

Algebra della notazione asintotica

Alcune sommatorie notevoli

Ripasso della notazione asintotica (1)


- Vogliamo valutare l'efficienza di un algoritmo, così da poterlo confrontare con algoritmi diversi che risolvono lo stesso problema.
- Lo facciamo in termini di **costo computazionale**, ovvero del tempo di esecuzione di un algoritmo e delle sue necessità in termini di memoria.
- Prediligiamo il tempo di esecuzione all'occupazione di memoria.

Ripasso della notazione asintotica (2)

In matematica la notazione asintotica permette di confrontare il tasso di crescita (comportamento asintotico) di una funzione nei confronti di un'altra.

$$f(n)=15n+1$$

$$g(n)=n^2$$



Ripasso della notazione asintotica (3)

In informatica, il calcolo asintotico è utilizzato per analizzare il costo di un algoritmo, in particolare per stimare quanto aumenta il tempo al crescere della dimensione n dell'input.

Esistono tre notazioni asintotiche:

- Notazione asintotica O :
è il limite asintotico superiore
- Notazione asintotica Ω :
è il limite asintotico inferiore
- Notazione asintotica Θ :
è il limite asintotico stretto

Ripasso della notazione asintotica (4)

Tale valutazione ha senso quando la dimensione dell'input è sufficientemente grande. Per questo si parla di **efficienza asintotica degli algoritmi**.

Notazione O (1)

Def. Date due funzioni $f(n)$, $g(n) \geq 0$ si dice che

$f(n)$ è in $O(g(n))$

se esistono due costanti c ed n_0 tali che

$$0 \leq f(n) \leq c g(n) \text{ per ogni } n \geq n_0$$



In $O(g(n))$ troviamo tutte le funzioni che risultano «dominate» dalla funzione $g(n)$

Notazione O (2)

Esempio. $f(n) = 3n + 3$

$f(n)$ è in $O(n^2)$ in quanto, posto $c = 6$:

$$cn^2 \geq 3n + 3 \text{ per ogni } n \geq 1.$$

Ma $f(n)$ è anche in $O(n)$ in quanto:

$$cn \geq 3n + 3 \text{ per ogni } n \geq 1 \text{ se } c \geq 6,$$
$$\text{oppure per ogni } n \geq 3 \text{ se } c \geq 4.$$



data $f(n)$, esistono **infinite funzioni** $g(n)$ per cui
 $f(n)$ risulta in $O(g(n))$.

Notazione O (3)

Esempio. Sia $f(n)$ un polinomio di grado m :

$$f(n) = \sum_{i=0}^m a_i n^i, \text{ con } a_m > 0$$

Dimostriamo che $f(n)$ è in $O(n^m)$.

Si osservi che, per ogni i , o $a_i \geq 0$ (e questo è certamente vero per a_m), o $a_i < 0$. Quindi:

$$f(n) = \sum_{i=0}^m a_i n^i \leq \sum_{i \text{ t.c. } a_i \geq 0} a_i n^i \leq n^m \sum_{i \text{ t.c. } a_i \geq 0} a_i$$

Ponendo $c = \sum_{i \text{ t.c. } a_i \geq 0} a_i$ si ha: $f(n) \leq c n^m$ per ogni n , cioè la tesi.

Notazione O (4)

Esempio. Sia $f(n) = \log n$.

$f(n)$ è in $O(\sqrt{n})$.

Più in generale, $\log^a n = O(n^{1/b})$ per ogni $a, b \geq 1$

Cioè:

Un poli-logaritmo è dominato da una qualunque radice

Notazione O (5)

Esempio. Sia $f(n) = n^{1/a}$.

$f(n)$ è in $O(n)$ per ogni $a \geq 2$.

Più in generale, $n^{1/a} = O(n^b)$ per ogni $a, b \geq 1$

Cioè:

Una radice è dominata da un qualunque polinomio

Notazione O (6)

Esempio. Sia $f(n) = n^a$.

$f(n)$ è in $O(2^n)$ per ogni $a \geq 1$.

Più in generale, $n^a = O(b^n)$ per ogni $a \geq 1$, e $b \geq 2$

Cioè:

Un polinomio è dominato da un qualunque esponenziale


Notazione Ω (1)

Def. Date due funzioni $f(n)$, $g(n) \geq 0$ si dice che

$f(n)$ è in $\Omega(g(n))$

se esistono due costanti c ed n_0 tali che

$f(n) \geq c g(n)$ per ogni $n \geq n_0$



In $\Omega(g(n))$ troviamo tutte le funzioni che «dominano» la funzione $g(n)$

Notazione Ω (2)

Esempio. Sia $f(n) = 2n^2 + 3$

$f(n)$ è in $\Omega(n)$ in quanto

$$2n^2 + 3 \geq cn \text{ per qualunque } n \text{ se } c = 1$$

Ma $f(n)$ è anche in $\Omega(n^2)$ in quanto

$$2n^2 + 3 \geq cn^2 \text{ per ogni } n, \text{ se } c \leq 2.$$

Notazione Ω (3)

Esempio. Sia $f(n)$ un polinomio di grado m :

$$f(n) = \sum_{i=0}^m a_i n^i, \text{ con } a_m > 0$$

Dimostriamo che $f(n)$ è in $\Omega(n^m)$.

Si osservi che, per ogni i , o $a_i \geq 0$ (e questo è certamente vero per a_m), o $a_i < 0$. Quindi:

$$\sum_{i=0}^m a_i n^i \geq a_m n^m + \sum_{a_i < 0} a_i n^i \geq a_m n^m + n^{m-1} \sum_{a_i < 0} a_i$$

Poniamo $c' = \sum_{a_i < 0} a_i$ e c' è negativa.

...

Notazione Ω (4)

segue Esempio. $f(n) = \sum_{i=0}^m a_i n^i$, con $a_m > 0$ è in $\Omega(n^m)$.

...

abbiamo: $f(n) \geq a_m n^m + c' n^{m-1}$

se $a_m + c' > 0$ abbiamo finito

altrimenti imponiamo $a_m n^m + c' n^{m-1} = n^m (a_m + c'/n)$

Per ogni $n \geq n_0 = c'/a_m$, si ha che per $c = a_m + c'/n$
è vero che $f(n) \geq c n^m$, cioè la tesi.

Notazione Ω (5)

Esempio. Sia $f(n) = \sqrt{n}$.
 $f(n)$ è in $\Omega(\log n)$.

Più in generale, $n^{1/b} = \Omega(\log^a n)$ per ogni $a, b \geq 1$

Cioè:

Una radice domina qualunque poli-logaritmo

Notazione Ω (6)

Esempio. Sia $f(n) = 2^n$.

$f(n)$ è in $\Omega(n^a)$ per ogni $a \geq 1$.

Più in generale, $b^n = \Omega(n^a)$ per ogni $a \geq 1$, e $b \geq 2$

Cioè:

Un esponenziale domina un qualunque polinomio

Notazione O e Ω - considerazioni (1)

Abbiamo visto che in entrambe le notazioni O e Ω , per ogni funzione $f(n)$ sia possibile trovare più funzioni $g(n)$.

In effetti $O(g(n))$ e $\Omega(g(n))$ sono insiemi di funzioni, e dire
“ $f(n)$ è in $O(g(n))$ ” oppure “ $f(n) = O(g(n))$ ”
ha il significato di “ $f(n)$ appartiene a $O(g(n))$ ”.

Notazione O e Ω - considerazioni (2)


Tuttavia, poiché i limiti asintotici ci servono per stimare con la maggior precisione possibile il costo computazionale di un algoritmo, vorremmo trovare – fra tutte le possibili funzioni $g(n)$ – quella che più si avvicina a $f(n)$.

Per questo cerchiamo la più piccola funzione $g(n)$ per determinare O e la più grande funzione $g(n)$ per determinare Ω . Formalmente:

Notazione Θ (1)

Def. Date due funzioni $f(n)$, $g(n) \geq 0$ si dice che
 $f(n)$ è in $\Theta(g(n))$

se esistono tre costanti c_1 , c_2 ed n_0 tali che
 $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$ per ogni $n \geq n_0$



Notazione Θ (2)

Esempio. Sia $f(n) = 3n + 3$.

$f(n)$ è in $\Theta(n)$ ponendo, ad esempio:

$$c_1 = 3, c_2 = 4, n_0 = 3.$$

Infatti:

$$3n \leq 3n + 3 \leq 4n \text{ per } n \geq 3$$

Notazione Θ (3)

Esempio. Sia $f(n) = \log_a n$.

$f(n) = \Theta(\log_b n)$ per ogni $a, b > 0$.

Basta usare la formula per il cambio di base dei logaritmi:

$$\log_a n = \log_b n \log_a b = c \log_b n$$

Il cambio di base è dunque asintoticamente irrilevante e per questo nella notazione asintotica la base del logaritmo viene spesso omessa.

Notazione Θ (4)

Esempio. Sia $f(n)$ un polinomio di grado m :

$$f(n) = \sum_{i=0}^m a_i n^i, \text{ con } a_m > 0$$

La dimostrazione che $f(n)$ è in $\Theta(n^m)$ discende dall'aver dimostrato che

$$\sum_{i=0}^m a_i n^i \text{ è sia in } O(n^m) \text{ che in } \Omega(n^m)$$

Calcolo della notazione asintotica tramite limiti

- se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = k > 0$ allora $f(n) = \Theta(g(n))$;
- se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$ allora $f(n) = \Omega(g(n))$ ma $f(n) \neq \Theta(g(n))$;
- se $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$ allora $f(n) = O(g(n))$ ma $f(n) \neq \Theta(g(n))$.

Ovviamente, quando il limite non esiste, questo metodo non si può usare e bisogna procedere diversamente.

NOTA: Nel nostro caso, le funzioni sono tutte positive (perché rappresentano tempi di esecuzione), quindi i limiti sono tutti non negativi...)

Algebra della notazione asintotica (1)

Per semplificare il calcolo del costo computazionale asintotico degli algoritmi si possono sfruttare delle semplici regole che enunciamo, chiarendole con degli esempi.

Le dimostrazioni sono lasciate per esercizio.

Algebra della notazione asintotica (2)

Regole sulle costanti moltiplicative


1A: Per ogni $k > 0$ e per ogni $f(n) \geq 0$,
se $f(n)$ è in $O(g(n))$ allora anche $k f(n)$ è in $O(g(n))$.

1B: Per ogni $k > 0$ e per ogni $f(n) \geq 0$,
se $f(n)$ è in $\Omega(g(n))$ allora anche $k f(n)$ è in $\Omega(g(n))$.

1C: Per ogni $k > 0$ e per ogni $f(n) \geq 0$,
se $f(n)$ è in $\Theta(g(n))$ allora anche $k f(n)$ è in $\Theta(g(n))$.

Informalmente, queste tre regole si
possono riformulare dicendo che:

le costanti moltiplicative
si possono ignorare.



Algebra della notazione asintotica (3)

Regole sulla commutatività con la somma

2A: Per ogni $f(n)$, $d(n) > 0$,
se $f(n)$ è in $O(g(n))$ e $d(n)$ è in $O(h(n))$
allora $f(n)+d(n)$ è in $O(g(n)+h(n)) = O(\max(g(n),h(n)))$.

2B: Per ogni $f(n)$, $d(n) > 0$,
se $f(n)$ è in $\Omega(g(n))$ e $d(n)$ è in $\Omega(h(n))$
allora $f(n)+d(n)$ è in $\Omega(g(n)+h(n)) = \Omega(\max(g(n),h(n)))$.

2C: Per ogni $f(n)$, $d(n) > 0$,
se $f(n)$ è in $\Theta(g(n))$ e $d(n)$ è in $\Theta(h(n))$
allora $f(n)+d(n)$ è in $\Theta(g(n)+h(n)) = \Theta(\max(g(n),h(n)))$.

Informalmente:

le notazioni asintotiche commutano con la somma.



Algebra della notazione asintotica (4)

Regole sulla commutatività col prodotto


3A: Per ogni $f(n)$, $d(n) > 0$,
se $f(n)$ è in $O(g(n))$ e $d(n)$ è in $O(h(n))$
allora $f(n)d(n)$ è in $O(g(n)h(n))$.

3B: Per ogni $f(n)$, $d(n) > 0$,
se $f(n)$ è in $\Omega(g(n))$ e $d(n)$ è in $\Omega(h(n))$
allora $f(n)d(n)$ è in $\Omega(g(n)h(n))$.

3C: Per ogni $f(n)$, $d(n) > 0$,
se $f(n)$ è in $\Theta(g(n))$ e $d(n)$ è in $\Theta(h(n))$
allora $f(n)d(n)$ è in $\Theta(g(n)h(n))$.

Informalmente:

le notazioni asintotiche commutano



Algebra della notazione asintotica (5)

Esempi di applicazione delle regole

Esempio 1

Trovare il limite asintotico stretto per $f(n) = 3n^2 + 7$.

$$3n^2 = \Theta(n^2) \text{ e } 7 = \Theta(1) = O(n^2) \text{ quindi } 3n^2 + 7 = \Theta(n^2).$$

Esempio 2

Trovare il limite asintotico stretto per $f(n) = 3n2^n + 4n^4$

$$3n2^n + 4n^4 = \Theta(n)\Theta(2^n) + \Theta(n^4) = \Theta(n2^n) + \Theta(n^4) = \Theta(n2^n).$$

Algebra della notazione asintotica (6)

Esempi di applicazione delle regole

Esempio 3

Trovare il limite asintotico stretto per $f(n) = 2^{n+1}$.

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n = \Theta(2^n).$$

Esempio 4

Trovare il limite asintotico stretto per $f(n) = 2^{2n}$.

$$2^{2n} = 2^n \cdot 2^n = \Theta(2^n) \Theta(2^n) = \Theta(2^{2n}).$$



le costanti moltiplicative si possono ignorare solo se **non** sono all'esponente.

Algebra della notazione asintotica (7)

Esempi di applicazione delle regole

Esempio 5

Trovare il limite asintotico stretto per $f(n) = 5 \cdot 2^{\log n} + 13$.

$$5 \cdot 2^{\log n} + 13 = 5n + 13 = \Theta(n) + \Theta(1) = \Theta(n).$$

Esempio 6

Trovare il limite asintotico stretto per $f(n) = \log^n n + 8 \cdot 2^{n \log n} + 3$.

$$\begin{aligned} \log^n n + 8 \cdot 2^{n \log n} + 3 &= \log^n n + 8n^n + 3 = \\ &= \Theta(\log^n n) + \Theta(n^n) + \Theta(1) = \Theta(n^n). \end{aligned}$$

Algebra della notazione asintotica (8)

Esempi di applicazione delle regole

Esempio 7

Trovare il limite asintotico stretto per $f(n)+g(n)$ dove
 $f(n) = n^2 + 13n$ e $g(n)=n^2-n$.

Sappiamo che $\Theta(f(n)+g(n)) = \Theta(\max\{f(n), g(n)\})$
perciò $\Theta(f(n)+g(n)) = \Theta(n^2) + \Theta(n^2) = \Theta(n^2)$.

Domanda: questa regola vale anche per la differenza?

Dipende! Non si può dire in generale, quindi dobbiamo studiare le costanti nascoste dalla notazione asintotica...

Algebra della notazione asintotica (9)

Esempi di applicazione delle regole

Esempio 8

Trovare il limite asintotico stretto per $f(n)-g(n)$ dove $f(n) = n^2 + 13n$ e $g(n) = \frac{1}{2} n^2 - n$.

In questo caso:

$$f(n)-g(n) = (n^2 + 13n) - (\frac{1}{2} n^2 - n) = \frac{1}{2} n^2 + 12n = \Theta(n^2).$$

Esempio 9

Trovare il limite asintotico stretto per $f(n)-g(n)$ dove $f(n) = n^2 + 13n$ e $g(n) = n^2 - n$.

$$\text{In questo caso: } f(n)-g(n) = (n^2 + 13n) - (n^2 - n) = 12n = \Theta(n).$$

Alcune sommatorie notevoli (1)

$$\sum_{i=0}^n i = \Theta(n^2)$$



Dimostrazione

Più precisamente, $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$:

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & + & 2 & + & 3 & + & \dots + n + \\ n & + & (n-1) & + & \dots & + & 2 + 1 = \end{array}$$

$$(n+1) + (n+1) + \dots + (n+1) \text{ n volte}$$

CVD

Più in generale: $\sum_{i=0}^n i^c = \Theta(n^{c+1})$ per ogni intero c
(dimostrare per casa)

Alcune sommatorie notevoli (2)

$$\sum_{i=0}^n 2^i = \Theta(2^n)$$



Dimostrazione

Più precisamente, $\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$:

$$\begin{array}{rcl} 2S & = & 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{n+1} \\ S & = & 1 + 2^1 + \dots + 2^n \end{array} =$$

$$S = 1 + 0 + \dots + 0 + 2^{n+1}$$

CVD

Più in generale: $S = \sum_{i=0}^n c^i = \frac{c^{n+1}-1}{c-1}$ per ogni c positivo diverso da 1 per cui:

$S = \Theta(c^n)$ se $c > 1$ e $S = O(1)$ se $c < 1$ (dimostrare per casa)

Alcune sommatorie notevoli (3)

$$\sum_{i=0}^n i 2^i = \Theta(n 2^n)$$




Più in generale:

$$\sum_{i=0}^n i c^i = \Theta(n c^n) \text{ per ogni } c > 1$$

(dimostrare entrambe per casa)

Alcune sommatorie notevoli (4)

$$\sum_{i=0}^n \log i = \Theta(n \log n)$$



Dimostrazione

$$S = \sum_{i=0}^n \log i = \log \prod_{i=0}^n i = \log n!$$

ma $n! \leq n^n$ e $n! \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}}$, perciò:

$$S \leq \log n^n = n \log n \rightarrow S = O(n \log n)$$

$$S \geq \log \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} = \frac{n}{2} \log \frac{n}{2} \rightarrow S = \Omega(n \log n)$$

CVD

Più in generale: $S = \sum_{i=0}^n \log^c i = \Theta(n \log^c n)$ per ogni $c > 1$
(dimostrare per casa)

Alcune sommatorie notevoli (5)

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \Theta(\log n)$$



dimostrazione
nella prossima
slide...

Dimostrazione

Usiamo l'approssimazione:

$$\int_a^{b+1} f(x) dx \leq \sum_{i=a}^b f(i) \leq \int_{a-1}^b f(x) dx$$

con $f(i)$ monotona non crescente

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln x|_{n+1} - \ln x|_1 \rightarrow S = \Omega(\log n)$$

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = 1 + \sum_{i=2}^n \frac{1}{i} \leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx =$$


$$= 1 + \ln x|_n - \ln x|_1 \rightarrow S = O(\log n) \quad \text{CVD}$$

serve per evitare che venga fuori al
prossimo passaggio $\ln x$ calcolato in 0...

Alcune sommatorie notevoli (6)

Nota.


E' vero che: $\int_a^{b+1} f(x)dx \leq \sum_{i=a}^b f(i) \leq \int_{a-1}^b f(x)dx$
con $f(i)$ monotona non crescente:



Vale analogamente che:

$\int_{a-1}^b f(x)dx \leq \sum_{i=a}^b f(i) \leq \int_a^{b+1} f(x)dx$
con $f(i)$ monotona non decrescente

Esercizi per casa



Esercizi per casa (1)

- Dimostrare tutte le regole sull'algebra della notazione asintotica.
- Calcolare l'andamento asintotico delle seguenti funzioni:
 - $f(n) = n^2 \log n$
 - $f(n) = 3n \log n + 2n^2$
 - $f(n) = 2^{\log n/2} + 5n$
 - $f(n) = 4^{\log n}$
 - $f(n) = (\sqrt{2})^{\log n}$

Esercizi per casa (2)

Classificare le seguenti funzioni per ordine di crescita, vale a dire, trovare un ordinamento $g_1, g_2, \dots, g_n$ delle funzioni che soddisfi:

$$g_1 = \Omega(g_2), g_2 = \Omega(g_3), \dots$$

Partizionare poi la lista in classi di equivalenza in modo che le funzioni $f(n)$ e $g(n)$ siano nella stessa classe se e solo se $f(n) = \Theta(g(n))$.

- $(\sqrt{2})^{\log n}$ ▸ n^2 ▸ $n!$ ▸ $(\log n)!$ ▸ $\log n^n$ ▸ n^3
- $\log(n!)$ ▸ 2^n ▸ $n \cdot 2^n$ ▸ $\log n$ ▸ $n \log n$
- $(3/2)^n$ ▸ e^n ▸ 5 ▸ $4^{\log n}$ ▸ $2/3$ ▸ $\log^2 n$

Notazione O (3)

Esempio. Sia $f(n) = n^2 + 4n$

$f(n)$ è in $O(n^2)$ in quanto:

$cn^2 \geq n^2 + 4n$ per ogni n se $c \geq 5$
oppure per ogni $n \geq 4/(c-1)$ se $c > 1$.

Dimostrazione della regola 1A

Regola:

Per ogni $k > 0$ e per ogni $f(n) \geq 0$, se $f(n)$ è in $O(g(n))$ allora anche $k f(n)$ è in $O(g(n))$.

Dimostrazione

Per ipotesi, $f(n)$ è in $O(g(n))$ quindi esistono due costanti c ed n_0 tali che:

$$f(n) \leq cg(n) \text{ per ogni } n \geq n_0.$$

Ne segue che:

$$kf(n) \leq kcg(n)$$

cioè, prendendo **kc** come nuova costante c' e mantenendo lo stesso n_0 , $kf(n)$ è in $O(g(n))$.

CVD

Dimostrazione della regola 2A

Regola:

Per ogni $f(n)$, $d(n) > 0$,

se $f(n)$ è in $O(g(n))$ e $d(n)$ è in $O(h(n))$

allora $f(n)+d(n)$ è in $O(g(n)+h(n)) = O(\max(g(n),h(n)))$.

Dimostrazione

Se $f(n)$ è in $O(g(n))$ e $d(n)$ è in $O(h(n))$ allora esistono quattro costanti c' e c'' , n'_0 ed n''_0 tali che:

$f(n) \leq c'g(n)$ per ogni $n \geq n'_0$ e $d(n) \leq c''h(n)$ per ogni $n \geq n''_0$

Allora: $f(n) + d(n) \leq c'g(n) + c''h(n) \leq \max(c', c'')(g(n) + h(n))$
per ogni $n \geq \max(n'_0, n''_0)$

Da ciò segue che $f(n) + d(n)$ è in $O(g(n)+h(n))$.

Infine:

$\max(c', c'')(g(n) + h(n)) \leq 2 \max(c', c'') \max(g(n), h(n))$.

Ne segue che $f(n) + d(n)$ è in $O(\max(g(n), h(n)))$.

CVD

Dimostrazione della regola 3A

Regola:

Per ogni $f(n)$, $d(n) > 0$, se $f(n)$ è in $O(g(n))$ e $d(n)$ è in $O(h(n))$
allora $f(n)d(n)$ è in $O(g(n)h(n))$.

Dimostrazione

Se $f(n)$ è in $O(g(n))$ e $d(n)$ è in $O(h(n))$ allora esistono quattro costanti c' e c'' , n'_0 ed n''_0 tali che:

$f(n) \leq c'g(n)$ per ogni $n \geq n'_0$ e $d(n) \leq c''h(n)$ per ogni $n \geq n''_0$

Allora:

$$f(n)d(n) \leq c'c''g(n)h(n) \text{ per ogni } n \geq \max(n'_0, n''_0)$$

Da ciò segue che $f(n)d(n)$ è in $O(g(n)h(n))$.

CVD

Le dimostrazioni delle altre regole, che coinvolgono le notazioni Ω e Θ , sono lasciate per esercizio.